

de chacune des valves, dénote qu'elles ont servi soit comme ornements, soit comme amulettes, à l'exemple des valves de *Bartlettia*, dont nous avons parlé dans une précédente communication.

*DIAGNOSES DE MOLLUSQUES NOUVEAUX
PROVENANT DE LA MISSION DU BOURG DE BOZAS,*

PAR MM. LE D^r A.-T. DE ROCHEBRUNE ET L. GERMAIN.

Les Mollusques rapportés par les membres de la mission du Bourg de Bozas, bien que peu nombreux (40 formes), présentent néanmoins un intérêt très grand, car, sans parler de la conservation parfaite des spécimens, ils proviennent de localités jusqu'ici à peu près inconnues, et plusieurs formes (13) sont entièrement nouvelles⁽¹⁾.

Nous en donnons aujourd'hui les diagnoses, en attendant un travail d'ensemble en préparation, où nous entrerons dans les détails qui ne sauraient trouver place dans ce recueil.

Limnœa Nimoulensis Rochbr. et Germ.

Testa rimata, ventrosa, subovata, opaca, fragili, pallide cornea, fere lævigata aut substriatulata; spira brevi, tectiformi, conica; anfractibus $3/2$, 4, rotundatis perceleriter crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, ovato $6/7$ altitudinis æquante; apertura subverticali, ovato rotundata, peristomate recto et acuto; columella contorta, superne subcanaliculata.

Alt., 0,0135 à 0,015; diam., 0,009 à 0,010; alt. apert., 0,010 à 0,011; diam., 0,007.

Habitat. : Nimoulé, bords du Nil. Blanc. Altitude : 650 mètres.

Planorbis Bozasi Rochbr. et Germ.

Testa supra subplana et centro regulariter concava, subtus concavo umbilicata (umbilicus medius, pervius, subprofundus), subdiaphana, nitida, cornea, aut corneo cinerea, irregulariter striatulata; anfractibus 4, 4 $1/2$ regulariter et velociter crescentibus, supra subrotundatis, subtus attenuatis, ac circa umbilicus angulatis; sutura supra mediocriter impressa, subtus regulariter profunda; ultimo maximo, subamplo; apertura parum obliqua, transversali subovata, superne sublimata, inferne exacte arcuata, peristomate recto, acuto.

Alt., 0,004 à 0,005; diam., 0,011 à 0,015.

Habitat. — Bords du Lac Challa, pays Oualamo.

⁽¹⁾ La plupart de ces formes sont dédiées aux membres de la mission.

Physopsis Didieri Rochbr. et Germ.

Testa sinistrorsa, ovato véntrosa, globulosa, opaca, subsolida, eleganter striata (striæ mediocre subæquales, regulariter dispositæ), spina brevis, subplanulata, apice bene depressa et compressa, anfractibus 4, perceleriter crescentibus, convexis, sutura profunda separatis; ultimo permaximo, tumido, regulariter convexo, circa suturam vix subplanato, ac fere totam altitudinem attingente; apertura subobliqua, semi ovata, superne angulata, inferne bene acuta, ac valide canaliculata, externe convexa, peristomate recto et acuto; columella contorta, truncata.

Alt., 0,014; diam., 0,012; alt. apert., 0,010; diam., 0,005.

Habitat. — Doufilé, bords du Nil Blanc. Altitude : 650 mètres.

Succinea Brumpti Rochbr. et Germ.

Testa elliptica, tenui, pellucida, consertim regulosissime striata, albida; spira brevi, anfractibus $3 \frac{1}{2}$, sutura profunda separatis; superior minutissimus, medianus mediocris, subovatus, ultimus amplior, ovato elongatus, longitudinis $\frac{2}{3}$ æquante; apertura vix obliqua, subovata, peristomate subrecto, acuto; columella subarquata, superne leviter subcanaliculata, marginibus callo parum producto, juncitis.

Alt., 0,008; diam., 0,004; alt. apert., 0,004; diam., 0,002.

Habitat. — Bords de la rivière Omo.

Limicotaria Joubini Rochbr. et Germ.

Testa perforata (perforatio semitecta), ovoideo oblunga, solidula, opaca, subtiliter striatulata, pallide ochracea, cum flammulis violaceo vinosis, irregulariter sparsis, ornata; spira oblunga, ad summum obtusa (apex laevigatus), anfractibus 7, convexiusculis, lente et regulariter crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo convexo, $3/5$ altitudinis æquante; apertura subobliqua, semi lunata, elongata, superne acute angulata, inferne ad basim columellæ subangulata, externe mediocriter convexa; peristomate recto et acuto; columella recta, superne dilatata, inferne attenuata.

Alt., 0,044 à 0,046; diam., 0,022 à 0,0245; alt. apert., 0,018; diam., 0,0115.

Habitat. — Entre les rivières Aba et Dongou, bassin du Congo. Altitude : 1,100 mètres.

Subulina Kassaïana Rochbr. et Germ.

Testa imperforata, gracillima, elongatocylindrica, solidula, translucida, parum nitente, corneo viridescente, mediocriter et regulariter striatulata; spira perelon-gata, cylindrica, ad summum obtusa; apice obtuso (anfractus embryonalis minutissimus); anfractibus 8, convexis, lente crescentibus, sutura profunda separatis; ultimo convexo; apertura obliqua, ovata, intus lutescente; peristomate recto, acuto; columella brevis, subrobusta, inferne abrupte truncata.

Alt., 0,0125 à 0,0145; diam., 0,003 à 0,0035; alt. apert., 0,003; diam., 0,002 à 0,0025.

Habitat. — Confluent du Kassai, Congo. Altitude : 300 mètres.

Trochonanina Bonhouri Rochbr. et Germ.

Testa mediocriter perforata, elevato lenticulari, subdepressa, tectiformi, solida, opaca, subnitida, cornea aut cinerea, eleganter et mediocriter striata (striae regulares, obliquae et sat undulatae); spira tectiformi subdepressa; anfractibus 5 1/2, 6, subconvexusculis; regulariter crescentibus, ultimo majore, carinato (carina acuta), supra subconvexo, infra convextiore; apertura obliqua, irregulariter transverse subrotundata, ad carinam subangulata; peristome recto, subincrassatulo; margine columellari supra reflexo ac triangulatum dilatato.

Alt., 0,010 à 0,011; diam., 0,0165 à 0,017; alt. apert., 0,007; diam., 0,0075 à 0,008.

Habitat. — Bords du lac Abbay.

Trochonanina Zeltneri Rochbr. et Germ.

Testa large perforatissima, acute carinata, subconoidea, nitida, subpellucida, supra subtilissime striatula (striae regulares), corneo furco zonata, infra uniformiter coffeo lactescente; spira conoidea, ad summum acuta (apex exiguis proeminens); anfractibus 6, convexiusculis, regulariter crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo majore, acute carinato, superne subpresso, interne convextiore; apertura obliqua, transverse irregulariter oblonga, peristome recto, acuto, margine columellari, superne breviter triangulatum dilatato.

Alt., 0,008; diam., 0,013; alt. apert., 0,0055 à 0,006; diam., 0,006.

Habitat. — Tumbo, pays Oualamo. Altitude : 1,902 mètres.

Vitrina Bozasi Rochbr. et Germ.

Testa subcomplanata, imperforata, transverse ovato elongata, pellucida, tenuissima, transversim concentrica plicata, plicis crassis, undulatis, corneobrunnea; nitidissima; spira brevissima, subdемissa, anfractibus 2,5, ultimo testam fere totam efformante, sutura profunda interne separato; apertura late ovata, margine columellari depresso, abbreviato, membranaceo, labrum subcrassum, cultratum.

Alt., 0,013; diam., 0,018; alt. apert., 0,008; diam., 0,006.

Habitat. — Bords de l'Ouellé, affluent de l'Oubangui.

Limax Sidamoensis Rochbr. et Germ.

Corpus crassum, cylindricum, postice attenuatum, subcarinatum; cauda obtusa; luteo cinereum, maculis pallide cœrulecentibus, nubeculis, passim obductum, rugosum, rugis obliquis, paululum reticulatis, ornatum; clypeus magnus, tumescens, antice regulariter angulatus, obtuse apiculatus, postice rotundatus, concentrica granulosus; pes luteolus, marginibus circulariter effusus; tentaculi luteoli.

Long., 0,052; lat. max., 0,012; long. clyp., 0,022; lat., 0,014.

Habitat. — Pays des Sidamo, au voisinage du Mont Abar. Altitude : 1,390 mètres.

Corbicula Doufilei Rochbr. et Germ.

Concha minuta, trigona, crassa, subsolida, striis concentricis minutis regulariter impressa, nitida olivaceo lutea, ad umbones pallidiore ac flammulis castaneis elongatis ornata; antice paululum compressa, subangulata, postice subattenuata, rotundata; umbonibus tumidis; ligamentum validum, breve, brunneum; dentes cardinales parvi; lamellae robustae, minutissime lenticulatae; impressio antica rotunda, subprofunda, postica superficialis; pagina interna valvarum violacea, subnitida.

Long., 0,008; lat., 0,007; crass., 0,005.

Habitat. — Doufilé, sur les bords du Nil blanc.

Spathella Bozasi Rochbr. et Germ.⁽¹⁾.

Concha transverse oblongo elongata, inaequilatera, subsolida, pallide olivaceofusca; striis incrementi regularibus, ad partem inferiorem laminosis; umbones minimi, vixerisi, contigui; margo dorsalis subellipticus, ventralis fere rectus, medio sat profunde sinuatus; anterior rotundata elongatus; posterior in rostrum longum subacutum productus; ligamentum longum; impressio muscularis anterior profunde impressa, longe elliptica; posterior ovata, lacrimiformis; intus pallide rosea, marginibus caeruleonitidis.

Long., 0,085; lat., 0,038; crass., 0,024.

Habitat. — Lit de la rivière Bass, apporté par les crues du lac Rodolphe.

Spathella Brumpti Rochbr. et Germ.

Concha oblongo ovata, compressa, inaequilatera, solida, subponderosa, corneo-brunnea, nitida; striis incrementi lati, distantibus, antice praesertimque postice, late laminosis; umbones erosi, prominuli, subinflexi, contigui; margo dorsalis fere rectus; ventralis convexus, subundulatus; anterior ovatus, posterior dilatatus, in rostrum subcompressum, subdecurvatumque productus; ligamentum longum, prominulum; impressio muscularis anterior, biplex, trapezoidalis, antice solum profunde impressa; posterior subquadrata; intus sordide rosea, cretacea, vix nitida.

Long., 0,080; lat., 0,042; crass., 0,025.

Habitat. — Lit de la rivière Bass, apporté par les crues du lac Rodolphe.

⁽¹⁾ Nous inscrivons sous toutes réserves le genre *Spathella*, proposé d'une part par Bourguignat, en 1885, pour des types démembrés des *Spatha*, de l'autre par J. Hall, également en 1885, pour un Lamellibranche du Dévonien d'Amérique; nous aurons à examiner plus tard la valeur de ces genres et à préciser l'auteur qui doit bénéficier des droits de priorité.